

# KULLANIM YERİ ZAMANI VE DOZU

ÜRÜN ADI	1. UYGULAMA ZAMANI VE ÖLÇÜSÜ (1Dönüm 100L/su)	2. UYGULAMA ZAMANI VE ÖLÇÜSÜ (1Dönüm 100L/su)	3. UYGULAMA ZAMANI VE ÖLÇÜSÜ (1Dönüm 100L/su)
BUĞDAY	Ekim Öncesi 685 g (500 ml)	Kardeşlenme Dönem 343 g (250 ml)	Sapa Kalkma Dönemi 343 g (250 ml)
MISIR	Ekim Öncesi 685 g (500 ml)	Ekimden 20-25 Gün Sonra 343 g (250 ml)	2. Uygulamadan 20 Gün Sonra 343 g (250 ml)
YONCA	Biçim Öncesi 685 g (500 ml)	1. Uygulamadan 15 Gün Sonra 343 g (250 ml)	2. Uygulamadan 15 Gün Sonra 343 g (250 ml)
AYÇİÇEĞİ	Ekim Öncesi 685 g (500 ml)	Bitki 25-30 cm Ulaştığında 343 g (250 ml)	2. Uygulamadan 20 Gün Sonra 343 g (250 ml)
PAMUK	Ekim Öncesi 685 g (500 ml)	Bitki 4-6 Yaprak Olduğunda 343 g (250 ml)	Taraklanma Başlangıcında 343 g (250 ml)
ÇELTİK	Ekim Öncesi 685 g (500 ml)	Salkım Oluşumunda 343 g (250 ml)	2. Uygulamadan 20 Gün Sonra 343 g (250 ml)
BAĞ	Kış Budaması Sonrası 575 g (420 ml)	Çiçeklenme Öncesi Yapraktan 343 g (250 ml)	2. Uygulamadan 20 Gün Sonra 343 g (250 ml)
PATATES	Ekim Öncesi 685 g (500 ml)	Yumru Teşekkülünde 343 g (250 ml)	2. Uygulamadan 20 Gün Sonra 343 g (250 ml)
SOĞAN	Ekim Öncesi 685 g (500 ml)	20 Gün Sonra 343 g (250 ml)	20 Gün sonra 343 g (250 ml)
ŞEKER PANCARI VE PAMUK	Ekim Öncesi 685 g (500 ml)	Bitki 25-30 cm Ulaştığında 343 g (250 ml)	2. Uygulamadan 20 Gün Sonra 343 g (250 ml)
LAHANA BROKOLİ KARNİ BAHAİR	Bitki 5-6 Yaprak Olduğunda	10 Gün Sonra 343 g (250 ml)	2. Uygulamadan 20 Gün Sonra 343 g (250 ml)
ZEYTİN, ELMA, ARMUT, ŞEFTALİ, KAYISI, KİRAZ, CEVİZ, FISTIK, NAR	Kış Budaması Sonrası Ağaç Gövde Ve Taca Gelecek Şekilde 82 g (60 ml / 1 Ağaç İçin)	Çiçeklenme Öncesi Yapraktan 41 g (30 ml / Bir Ağaç İçin)	2. Uygulamadan 20 Gün Sonra 41 g (30 ml / Bir Ağaç İçin)
TURUNÇGİLLER	Topraktan 34 g (25 ml)	Çiçeklenmeden Önce 17 g (12,5 ml)	Çiçeklenmeden Önce 17 g (12,5 ml)

1000 ml = 1200 g